

# Distinguer la larve de cétoine de celle du hanneton

Où avez-vous trouvé cette larve ? C'est la première question à vous poser : la larve de cétoine est surtout présente dans les **composteurs** ou sur des matériaux organiques en décomposition, quand la larve de hanneton aime vivre dans les **profondeurs de la terre**. Vous la trouverez généralement en bêchant votre jardin ou en retournant de la terre.


- La **couleur** des larves de cétoine est plutôt blanc grisâtre, quand celle des larves de hanneton est plus jaunâtre.
- Elles ont également des **patte**s courtes, plus courtes que la largeur de leur corps. C'est l'inverse pour les larves de hanneton.
- La **tête** des larves de cétoine est plus petite que leur corps, leur abdomen est enflé. La tête de la larve de hanneton est plus grosse.
- Les larves de cétoine ont plus de poils sur le dos : elles s'en servent pour se mouvoir. Positionnez les larves **sur le dos** : elles remueront, quand celles du hanneton, qui se déplacent à l'aide de leur pattes, ne bougeront pas une fois retournées.
- Les larves de cétoine sont généralement **plus grosses** et peuvent atteindre 3 à 4 cm.

Larve de cétoine	Larve de hanneton
Blanc grisâtre	Blanc jaunâtre
Petite tête	Grosse tête
Pattes courtes	Pattes plus longues
Remue sur le dos	S'immobilise sur le dos

## Larve de cétoine

Petite tête, gros cul, petites pattes

Se déplace sur le dos, les pattes en l'air par ondulations



## Larve de hanneton

Grosse tête, petit cul, grandes pattes

Utilise plutôt ses pattes pour se déplacer.

